细支气管炎

Simplified Chinese



细支气管炎是幼童中常见的胸部感染,由肺部病毒感染引起,致使气管发炎和粘液堆积,造成呼吸困难。

细支气管炎在不到6个月大的婴儿中最常见,但有时在不到12个月大的婴儿中也会出现。

药物通常对治疗细支气管炎无益。婴儿需要休息,每次喂的量要少、次数要多,这样他们不会在喂食时觉得太累,也不会脱水。

如果你孩子有细支气管炎,最初几天你们应该避免和他人接触,因为引起细支气管炎的病毒是传染的。

细支气管炎的迹象和症状

这个病从感冒开始,孩子最初的症状可能包括轻微咳嗽、流鼻涕或鼻子塞住。一、两天后,孩子咳嗽可能会加剧,而且开始有一些呼吸困难。他们的症状可能包括:

- 呼吸急促
- 呼吸声大, 像得细支气管炎的呼哧声音
- 呼吸得很辛苦 你会看到孩子呼吸时肋骨或脖子下面皮肤吸气的动作或鼻孔煽动; 幼婴呼吸时脑袋还会上下晃动
- 烦躁和发烧
- 饮食困难

第二天或第三天的症状通常最糟糕,孩子的病会持续7到10天,咳嗽会持续2到4周。

什么时候去看医生

如果你认为孩子得了细支气管炎就应该去看医生。大多数情况下无需拍X光片、鼻拭检查或验血就能确诊是细支气管炎。

如果孩子呼吸困难或喂奶困难,他们可能需要住医院。在医院里医护人员需要:

- •观察孩子
- 给孩子输氧
- 用胃食管通过鼻腔到胃部补液或直接打静脉点滴。

不会用抗生素,因为细支气管炎是由病毒引起。抗生素对病毒没有作用。类固醇、肾上腺素和哮喘药物之类的药物对治疗细支气管炎也起不到作用。

有些得细支气管炎的婴儿情况迅速恶化的风险较高。**如果他们出现得细支气管炎的症状而且他们属于以下情况, 带他们去最近的医院 急诊部**:

- 早产
- •不到10周大
- 有慢性肺病、先天性心脏病、慢性神经系统疾病或免疫功能低下
- 原住民或托雷斯海峡岛民

在家如何照料

大多数得细支气管炎的婴儿见过医生后可以在家接受治疗。你可以按以下方法照顾你的孩子:

- 让孩子休息好。
- •增加喂奶次数,或每次少喂些配方奶但增加喂的次数,这样他们不会在喂奶时觉得太累,也不会脱水。
- 盐水滴鼻液或鼻喷剂有助于清除鼻腔里的粘液, 这样在喂奶时孩子会更舒服。
- •不要让任何人在家里或孩子周围吸烟,这对得呼吸道疾病的婴儿尤为重要。

如果孩子得细支气管炎而且有以下情况, 你应该再带孩子去看医生:

- 孩子咳嗽而且越咳越厉害
- 孩子的进食量不到正常的一半或孩子拒绝进食
- 孩子似乎很累或比平时要困
- 你出于任何理由感到担心。

如果孩子出现以下情况, 去看最近的医生或医院急诊部:

- 孩子呼吸困难、呼吸没有规律或在休息时呼吸急促
- 因为咳嗽或呼哧呼哧喘气无法正常喂食
- 孩子咳嗽时脸色出现变化
- •皮肤苍白而且出汗。

如果孩子呼吸困难或嘴唇开始发紫, 立即打电话叫救护车。

重点记住

- •细支气管炎是一种常见胸部感染,由病毒引起,影响不到12个月大的婴儿。
- 孩子的病通常会持续7到10天, 最初几天发病时会传染。
- •如果孩子呼吸困难、饮食困难,去看医生。
- •细支气管炎通常不用药物进行治疗。孩子需要多休息,少吃多餐。
- 确保孩子处于一个无烟环境。

要了解更多信息

- 儿童健康信息: <u>儿童发烧</u> (rch.org.au/kidsinfo/fact sheets/Fever in children)
- 儿童健康信息: <u>为儿童去痛</u> (rch.org.au/kidsinfo/fact sheets/Pain relief for children)
- Dr Margie: 如何识别儿童的各种咳嗽 (rch.org.au/drmargie/2015/06/16/how-to-recognise-the-different-types-of-cough-in-children)
- Better Health Channel: 细支气管炎 (betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/bronchiolitis)
- •去看医生



The Royal Children's Hospital编制, 维州州政府协助。rch.org.au/kidsinfo

2018年审定

儿童健康信息获The Royal Children's Hospital Foundation支持,捐赠网址: rchfoundation.org.au。

免责声明

本资料不应替代医生或健康专业人员的建议。RCH已尽所有合理努力确保出版时本资料的准确性。RCH对本资料所列治疗方法的任何错误、造成的误解或成功把握不负任何责任。本资料会定期更新,请务必注意使用最新版本。